

Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino

SCHEDA N.76

***Cortaderia selloana* (C. argentea, Gynerium argenteum) (Poaceae, ex Graminaceae) Sud America
Erba o Piume delle Pampas**

(Categoria delle erbacee perenni rustiche)



Cortaderia selloana



Cortaderia selloana
Varietà <'White' & 'Pink Combo'>

Pianta cespitosa con grandi e densi ciuffi di foglie nastriformi seghettate, taglienti, da cui emergono le alte infiorescenze piumose e argentee che, dopo l'essiccazione, vengono molto utilizzate per la composizione di fiori secchi. Poiché teme le invernate molto rigide e umide, è opportuno proteggerla nelle regioni settentrionali.

- Terreno: fertile, permeabile (pH 6-8). Solo le varietà nane possono essere coltivate in vaso, ma si deve scegliere un vaso grande (minimo cm 50x50x50). Nel vaso si utilizza una composta mista al 50% di suolo argilloso-sabbioso e torba universale.
- Esposizione: sole; la Cortaderia sopporta il caldo intenso, la salsedine e i venti salmastri.
- Propagazione: per divisione dei cespi in primavera. Si può anche seminare in febbraio, in letto caldo; le piantine si ripicchettano appena possibile e si mettono a dimora alla fine di marzo.
- Altezza: m 1.50-2.50. Foglie ricadenti, glauche, lunghe 1-1.50 metri.
- Distanza d'impianto: m 2 circa.
- Fioritura: in fine estate. Le infiorescenze a pannocchia, costituite di piccoli fiori argentei, rosati, purpurei o giallastri, sono lunghe fino a m 1. Le piume delle piante femminili sono più ornamentali di quelle delle piante maschili.
- Varietà: 'Pumila' (m 1-1.5); 'Rendatleri' (m 2-2.5) con piume porpora-argento; 'Sunningdale Silver' (m 2.5-3), con infiorescenze rade ma più grandi rispetto a quelle della specie tipica; 'White' (m 2-2.5) con piume bianche; 'Pink Combo' (m 2-2.5) con piume rosa; 'Aureolineata', una varietà nana adatta per la coltura in vaso che produce pennacchi di colore giallo, e che è caratterizzata dal fogliame inarcato.
- Malattie: la pianta può essere attaccata da diversi funghi e parassiti: a fine marzo occorre, quindi, eseguire trattamenti preventivi con antifungini e lotta agli insetti con antiparassitari adeguati. Il *Marciume radicale* può presentarsi sulla pianta a causa di ristagno dell'acqua.
- Impiego: isolata o a gruppi di poche piante; infiorescenze recise di lunga durata se raccolte ancora chiuse e lasciate asciugare all'aperto.

Curiosità e note aggiuntive

Il nome deriva da < cortado >, cioè *coltello*, in quanto veramente tagliente. In Inghilterra, negli anni '70-'80, la Cortaderia veniva utilizzata dalle coppie aperte per informare che in quella casa si era disponibili allo scambio. Questo simbolismo si ripercuote ancora oggi sulle vendite che, per il suddetto significato, hanno visto un grosso calo nel Regno Unito.