

Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino

**SCHEDA N.61**

***Cheiranthus cheiri* (*Erysimum cheiri*) (Cruciferae o Brassicaceae) Europa, Italia – Violacciocca gialla**



*Cheiranthus cheiri* 'Golden Bedder'



*Cheiranthus cheiri* (mix di varietà)



*Cheiranthus cheiri* 'Ruby Gem'

(Categoria delle erbacee perenni rustiche)

Pianta perenne, generalmente coltivata come biennale, molto apprezzata per l'abbondante e durevole fioritura. Allo stato spontaneo si trova spesso sulle vecchie mura. Conta diverse varietà orticole, a volte confuse con quelle derivanti dal genere consimile *Erysimum*, come si verifica per il *Ch. allionii* probabile ibrido di *Erysimum*. Vi si comprendono anche numerose varietà nane che si adoperano per il giardino roccioso, mentre le alte vengono spesso adoperate per la produzione di fiori da taglio.

- Terreno: permeabile, alcalino (pH 6.5-7.5).
- Esposizione: sole.
- Propagazione: semina da effettuarsi in estate-autunno, nei climi miti, in primavera nei climi freddi.

Dopo la semina, quando le piantine sono alte circa cm 15, si cimano per favorire la formazione di rametti laterali dalla base. Le giovani piantine possono essere sottoposte a trapianto.

- Altezza: cm 40-50 (varietà alte), cm 20-30 (varietà nane). Portamento eretto.

- Distanza d'impianto: cm 30-50.
- Fioritura: in inverno-primavera nei climi miti, in primavera-estate in quelli freddi. Fiori profumati, di colore normalmente giallo, ma nelle varietà, oltre a quest'ultimo, lo possiamo avere anche: bianco, arancio, scarlatto, cremisi e porpora.

- Varietà. Tra le varietà alte, elenchiamo: 'Blood Red' rosso vivo – 'Carmin King' carminio – 'Eastern Queen' rosa salmone – 'Cloth of Gold' giallo oro – 'Fire King' rosso arancio carico – 'Ruby Gem' rosso rubino – 'Vulcan' cremisi scuro. Tra le varietà nane, citiamo: 'Golden Bedder' giallo oro – 'Scarlet Bedder' rosso scarlatto – 'Orange Bedder' arancio – 'Harpur Crewe' sterile, a fiori doppi, gialli.

- Altre specie: *C. semperflorens* (*C. mutabilis*), a fiori profumati, prima color panna poi porpora; l'ibrido *C. x allionii*, a fiori color arancio acceso.

- Malattie: le radici possono essere attaccate dalle larve della *Mosca delle radici del Cavolo*, che determinano l'avvizzimento e la morte delle giovani piante. Inoltre sulle radici possono formarsi protuberanze irregolari, causate dall'*Ernia del Cavolo*, che rallenta la crescita della pianta. Alla base dei fusti si possono formare *Tumori*. La *Fasciazione* consiste nella formazione di germogli appiattiti, addensati e poco sviluppati, al livello del terreno. L'*Oidio* si manifesta con macchie gialle sulla pagina superiore delle foglie e con una muffa biancastra sulla pagina inferiore; le piante colpite rallentano la crescita. Inoltre le piante attaccate dalla *Ruggine bianca delle Crucifere* presentano foglie e fusti deformati e coperti da una polvere bianca.

- Impiego: roccaglie, aiuole, muri fioriti, vasi, fiori recisi.

**Curiosità e note aggiuntive**

Il nome è di origine controversa; per alcuni esso deriva probabilmente dalle parole greche <chêir> "mano" e <ànthos> "fiore"; altri lo vogliono derivato dall'arabo <kheyri>, termine che si riferisce ad un fiore rosso e fragrante. Nel linguaggio dei fiori la Violacciocca simboleggia la bellezza durevole e la fedeltà. E' soprannominata <Fiore delle api>, perché veniva piantata nei pressi degli alveari per attrarre e nutrire le api.