

Schede tecniche per la coltivazione e la cura delle piante da giardino

SCHEDE N.133

*Howea forsteriana (Kentia forsteriana) (Palmae o Arecaceae) Isole Lord Howe (Oceania) – Kenzia*

(Categoria delle ornamentali da vaso)



*Howea forsteriana (Kenzia)*



*Howea forsteriana (foglie)*



*Howea belmoreana (Palma riccia)*

E' la palma più diffusa per l'ornamento degli interni. Acclimata in Sicilia, ove fruttifica regolarmente all'aperto, è oggetto di importante coltura in vaso e commercio.

- Ambiente e modalità di coltura: per composta da vaso usare terriccio di bosco, oppure 2/parti di terra d'erica più 1/parte di terriccio di bosco. Vasi più piccoli che sia possibile (le piante di 4 anni, alte cm 60-70, vengono commerciate in vasi da cm 10-12). Luminosità attenuata specialmente nei primi anni di vita. Stante il lento accrescimento, i coltivatori spingono la vegetazione delle piantine con il calore (20-25°C, in cassone su letto caldo o in serra), l'umidità abbondante e la collocazione molto fitta e l'ombreggiatura, al fine di favorire l'allungamento del picciolo delle foglie. Al quarto anno, le piante hanno raggiunto le dimensioni sopra indicate e cominciano ad essere esitate per il consumo. Durante il predetto periodo hanno subito un paio di rinvasature e, dopo ciascuna di esse, sono tenute ad aria confinata per una quindicina di giorni al fine di accelerarne la ripresa. Frequente la preparazione con 3 piante per vaso allo scopo di ottenere esemplari "a ciuffo" (à touffé). Negli anni in cui non si rinvasano si somministra alle piante un concime liquido diluito, da aprile a settembre. La conservazione negli interni delle abitazioni richiede diversi lavaggi delle foglie, annaffiature abbondanti in estate, ridotte in inverno, luminosità diffusa. Temperatura minima 7-8°C. Nelle zone a clima temperato, le Kenzie si coltivano anche all'aperto, ma durante l'inverno devono essere protette con serre mobili o ripari di altro tipo.

- Propagazione: da semi di recente raccolta in cassette o terrine ben drenate e riempite con terriccio di bosco, torba e sabbia, alla temperatura di 20-25°C. Appena emessa la prima fogliolina della germinazione, le piantine si invasano in piccoli vasi da cm 5-6 e si procede alla coltura sopra indicata.

- Altezza: può raggiungere e superare i 15 metri ma le dimensioni con cui le piante si commerciano vanno dai cm 60 ai m 3 circa. Portamento a fusto eretto e foglie arcuate.

- Fioritura: in estate. I fiori sono piccoli, biancastri, unisessuali, in infiorescenze pendule. Fioriscono solo gli esemplari adulti, coltivati in piena terra nelle regioni meridionali.

- Altra specie: *H. belmoreana (Palma riccia)* endemica dell'isola di Lord Howe, un po' più delicata e meno alta della *H. forsteriana*.

- Malattie: tra i parassiti che più comunemente attaccano le Kenzie ci sono: *Afidi*, *Acari*, *Tripidi* e *Cocciniglie*, che oltre a produrre sostanze zuccherine e appiccicaticce sui tessuti della pianta, possono provocare antiestetiche deformazioni e decolorazioni sulle foglie. Tra le malattie fungine più diffuse abbiamo, invece: *Phytophthora palmivora*, un fungo che attacca le radici della pianta, provocandone la morte.

- Impiego: ornamento di interni, verande, atri, giardini d'inverno.

**Curiosità e note aggiuntive**

Il nome ricorda il luogo di origine della pianta, cioè le isole di Lord Howe nell'Oceano Pacifico. La Kenzia è, oltretutto, una pianta da appartamento molto utile alla salute in quanto purifica l'aria degli interni diminuendone l'inquinamento.